




Kan betre kartlegging av nedfallet gi meir målretta forvaltning?

14.04.2011

Reindriftsforvaltningen
Boazodoallohåiddahus
Báátsoe-burrije reereame
Lavrans Skuterud




Eksempel (2)

Østre Namdal - Steinfjell

Lom

14.04.2011

Reindriftsforvaltningen
Boazodoallohåiddahus
Báátsoe-burrije reereame
Lavrans Skuterud




Bakgrunn

- Tiltaksregimet/forskrift om radioaktivitet i reinkjøtt er basert på at det er systematiske sesongforskjellar i rein ⇒ Stadig unntak frå forskrifta
- Med betre kunnskap om nedfall/forureining kan vi lage regime tilpassa utfordringane i kvart område

14.04.2011

Reindriftsforvaltningen
Boazodoallohåiddahus
Báátsoe-burrije reereame
Lavrans Skuterud




Eksempel (3)

Vågå tamreinlag

14.04.2011

Reindriftsforvaltningen
Boazodoallohåiddahus
Báátsoe-burrije reereame
Lavrans Skuterud



Eksempel (1)

- Luru vinteren 2009/2010:
 - Forventa relativt høge nivå i des.; snitt 4300 Bq/kg, maks. 5800 Bq/kg, ~90 dyr på nedføring i 5 veker
 - Ny samling jan.: Alle under 3000 Bq/kg
 - Regelverket burde stimulert til utsatt slaktning i desember – i staden ville dei miste tilskot

Laarteiluru

14.04.2011

Reindriftsforvaltningen
Boazodoallohåiddahus
Báátsoe-burrije reereame
Lavrans Skuterud



Kva veit vi om forureininga?

- Kommunegjennomsnitt frå 1986 (4 prøver i kvar)
- Spreidd prøvetaking i 1986-87
- Målingane av rein i alle år (ikkje representative)
- Reineigarane har noko erfaring med kva for område som er forureina (relativ info)
- Lite systematisert

14.04.2011

Reindriftsforvaltningen
Boazodoallohåiddahus
Báátsoe-burrije reereame
Lavrans Skuterud

